

Taplin II 85.

de

Morley  
ex. B. 200





三

湯下之脉浮渴欲飲水者用涼解之十可救其  
舌根微黑尖黃色隱見或有一紋者脉實急大臥氣



舌六十三

散十生七八也


陽差要風寒者微汗之用双解散之老下利用解毒  
舌根微黑尖黃色脉滑者可下之脉浮可養阴是



舌五十三


脉浮渴欲飲水用涼散十可救其二三方見前  
舌見灰黑而色黑者脉實急用大承氣湯下之





舌四十三

三次下見之見黃黑不治



舌見

風寒者用雙解散加解毒散之



舌三十三

者不陽非結者可治

解毒陽相平微汗之罷急下之如結胸煩燥目真視

舌見外淡紅心淡黑者如惡風未罷用雙解散加



舌二十三

死惡寒甚死惡寒下利可治用調胃承氣湯主之

舌見黃色中黑至尖者熱氣已深而感見之十當九





一十三

者此病循水摸床者不治黑糞亦不治且大承氣湯


舌見黃色而黑點生其症必渴謔脈滑者生脈濡



舌十三

承氣湯下之推遲可愈三四次方退不退者不治

舌見四邊微紅中央黑灰色者此由失下而致用大



舌九十二

湯症用大黃酒心湯


血用抵當湯水在脇內用十棗湯結胸甚者大陷胸

煩渴急宜大承氣湯下之若身發黃者用茵陳湯下

舌見黃色而溢有隔辦者熱已入胃邪毒深矣心火



舌八十二



二服合進之前見脈結者防凡通聖散方見前


古見黃而尖白者素少裏多宜天水散一散涼膈散



色七十二

桔梗下氣湯下之前見蒼朮下水煎服三片寒二枚不拘服時  
厚朴下陳皮下枳實下調胃承


舌見黃而小黒点者邪遍六腑將入九臟急服調胃承



舌六十二


者下散益元散兼服須待黃盡方可下也方見前  
舌見白而中黃者必作煩渴嘔吐之證兼有素






舌五十二

見白胎滑比臟結之證邪併入臟難治




舌四十二

熱宜小柴胡湯和解之為邪在半表半裏必往未寒



舌三十二

舌左白胎而自汗者不可下宜白虎湯加參服之




舌二十二

鬼賊邪氣深也不治用調胃承氣湯下之方見前



已入胃宜急下之若下遲必變黑色為要證為亢害  
 舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱



香 一十二

枳實 水 二錢 芍藥 三片 二枚煎服

大柴胡湯 大柴胡 枳實 芍藥 半夏 大黃 枳實 半夏 枳實 半夏 枳實 半夏

白滾水調服如發未用豆豉蔥頭藥湯調服


天水散 甘草 二錢 芍藥 三片 二枚煎服

水 二錢 芍藥 三片 二枚煎服

小柴胡湯 大柴胡 枳實 芍藥 半夏 大黃 枳實 半夏 枳實 半夏 枳實 半夏

主之可下者大柴胡湯下之表裏雙除隨證合天散

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天散




香 一十二



者五散方見前

香中見白胎外則微黃者必作泄宜服解毒湯惡寒



香九

水二鍾為三片煎入不拘服


活石 甘草 煎 白木 山梔 右共每服二丸

大黃 麻黃 連心 芒硝 石黃 黃芩 桔梗

雙解散加解毒湯 凡 川 當歸 芍藥

裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩傳主之

舌見微黃色者初得之發證者由失汗表邪入



舌八

加大黃酒浸炮解毒湯方見前




宜急下之服鮮毒湯下三五次遲則難治如初服量  
舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎命門也



涼脾散方見前

雖惡宜涼腸散微表退即當下之下用調胃承氣湯  
舌見白胎中黑有黑小點亂生者尚有表証其病未之



右每服五錢水一中半煎一中去海熱服

鮮毒湯川連二黃柏炙二小黃芩

西水虎湯知母甘草煎下藥在煎共服加參亦可

白虎湯知母甘草煎下藥在煎共服加參亦可

赤危證也上冬散方見前



至甚者五散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此  
 舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不



舌五+

水氣湯 甘草 大黃 硝石 水煎服

實者可下 胎即病 危殆之甚也 速建調胃  
 舌見弦白心黑而脉沉微者難治脉浮滑者可汗沉



舌心黑+

右婦末每服五入姜汁蜜各少許白湯調服

由桂末 木通 滑石 甘草各二

也 冬散 散固陳即 澤瀉 入白蜜少許 熱服 利為度 白木各


竹葉 廿片 煎八分 共為末 每服一 水二盞 淡

桑腸散 生甘草 二 連翹 炒 支 大黃 二 黃 二



調服

用五苓散加木通合益元散加羌活少許以白滾湯  
攻之如大便秘者用涼膈散加硝黃泡服小便澀者  
舌見尖白根黃其表證未罷也須宜解表然後方可



教氏傷寒金鏡錄廿四圖方

姑蘇薛已識

舌見此症黑色水冠火明矣患此者百無一治



前十二舌終

理中湯 參 乾姜 附子 水二鍾煎服  
四逆湯 參 乾姜 附子 水二鍾煎服



舌見如繚形也用理中合四逆湯溫之

舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥于肝經肝主筋故



舌陰


胃承氣湯下之方見之後

毒熾甚堅結大腸金受火制不能平木故也急用調  
 舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有刺者此熱



舌黑裏  
 十

大在上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之<sup>後方見</sup>  
 舌見紅色更紅深紅點如蠶之狀者乃熱毒熾甚



舌碎  
 九




炎上故發裂也宜用涼膈散方見後  
 舌見紅色更有裂紋如入字形者乃居火燔灼熱毒

人亦有此形




承氣湯下之方見後

心胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是證也是以用  
 舌見淡紅色而中有一紅暈皆純黑乃餘毒實故



葉石羔湯治之方見後

舌見紅色尖見青黑者水虛火實腎熱所致宜用竹




六尖黑  
 舌




陳五苓散治之方見後


不勝者假火勢以侮脾胃上將欲發黃之後也宜用茵



班矣宜用玄參升麻葛根湯化班湯鮮之方見後  
舌見紅而色有小黑者熱毒乘虛入胃蓋熱則發



晨火熾反兼水化宜涼膈散大柴胡湯下之方見後  
舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也





拘已未患者皆宜用之

去水服建為度未建仍用藥吹入凡瘟疫之家不吐  
共為未令病人先喻水一口以藥少許吹鼻內

當歸


白芷

細辛

牙皂

透頂清神散

舌見紅紅色熱蓄於內也不問何經宜用透頂清神散治之




二瘟疫將  
舌紅

梔子豉湯  
方見後

小柴胡湯  
方見後

少陽半表半裏之證也宜用

舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱中有寒乃



乙  
舌胎白

驗證舌法



決生死之妙也

傷寒用藥說

夫醫者何猶防之將也凡視人侵境方其至也必矚之其  
而療之且疾之襲人若寇之入以安撫之安撫之先以安撫之  
勢之強弱先以安撫之退至再至三三強強強強強強強強強強  
也如堅然不退至再至三三強強強強強強強強強強強強強強  
之除奈何必選將鍊兵起期致戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰  
無措則地土陷矣豈非將者不識戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰戰  
以

誨故姑撮其要領以告後人  
疾之不愈也余每察脉用藥覺有疑滯幸承先師之  
反嫁之疾焉苟能如將之用兵健退合宜操存何  
藥之時時欲大膽欲輕淺者即解和重深者即解和重深者即  
抵病之輕淺者即解和重深者即解和重深者即解和重深者即  
錯亂助病日深殊不知醫乃司命其可輕忽如此大  
瘥茫茫然當解而解不當吐下而吐下畏首畏尾顛倒  
致悞也可勝嘆哉夫今之醫不閱方書不察脉理臨



作二十四圖并方治列於左此理推源尋流實可  
害承逆制今以前十二舌明着猶恐未盡諸瘵後  
如火之自炎則其熱散入絡臟之中鮮有不死者  
受邪毒日深為症必作熱雖宜下之乃去其胃  
有變化水象故色從黑而應水化也若臟腑皆  
十無一生此心火自炎與邪熱二火相乘熱極則  
黑變症鮮越此為難治若見舌胎如漆黑之光者

矣至此醫之不依况誤用湯丸失於遲下其胎必  
黃胎乃邦已入於胃急宜下胎自黃去而疾安  
矣切勿不可不明未證故邪傳於裏未罷則舌必見  
邪入於半表半裏之間其舌色變為白胎而滑見  
離明入得病初在表則舌自紅而無白胎等色表  
之妙也如舌本者乃心之竅於舌心屬火主熱象  
送厥泄利或但惡寒而無發熱惡寒湯水之症一  
病初則頭痛必先發熱惡寒湯水之症一病便有



傷寒金鏡錄  
之邪也。若始終皆熱症，惟熱而不惡寒，故傷寒為熱。後必有湯水燥熱之證，或<sup>其</sup>脈而利，此熱症傳經。但可養陰退陽，此識脈之要也。或初病即惡寒發，有力病久熱甚，氣衰脈必微細，而無力方數甚也。其得病之初，正氣相搏，若真氣未衰，脈必滑數，而表裏汗下之症，不有悞。況脈者血之府，屬陰，當凡傷寒熱病傳經之邪，比雜病不同，必辨其脈症。





